

İNTRADERMAL ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

Malzemenin özellikleri :

- Model, anatomik olarak el bileği ile dirsek arasındaki ön kol bölümü ile uyumludur.
- Kol bölgesinde intrakutanöz enjeksiyonlar için sekiz farklı bölge bulunmaktadır.
- Sıvı doğru uygulandığında, ciltte karakteristik görünüm oluşturmaktadır.

12

INTRADERMAL ENJEKSİYON UYGULANMASI

İlacın enjeksiyon yolu ile deri içine verilmesidir. Daha çok alerji ve duyarlılık testler için uygulanır (Şekil 1).


Hazırlık:

1. Enjeksiyon bölgesi ön kolun iç yüzüdür.
2. Hastanın önkolu sağlam bir biçimde desteklenmelidir.
3. Eller ve hastanın derisi dezenfekte edilmelidir.

Uygulama:

1. Ön kolun derisi başparmakla sıkıca çekilerek gergin hale getirilir.
2. Enjektör, iğnenin kesik ucu yukarı bakacak şekilde, 10 - 15° açı ile, yüzeysel olarak deriye batırılır. İğnenin başı içeri girer girmez sıvı verilir.
3. Enjeksiyondan sonra iğne çekilince “ portakal kabuğu” adı verilen küçük bir kabartının oluşması gerekir (Şekil 2).
4. İğne ve şırınga hızla çekilmelidir.
5. Uygulama yapılan bölgeye kesinlikle masaj yapılmaz.
6. Enjeksiyon sonra bölgesel olarak şiddetli kaşıntılar olabilir. Hastaya enjeksiyon bölgesini kaşımaması ve kirletmemesi söylenmelidir. Aksi takdirde testin okunması zorlaşabilir.

Şekil 1: Enjeksiyon uygulama yöntemleri.



Şekil 2: “Portakal kabuğu” adı verilen küçük kabartı.

