

INTRAMUSCULER ENJEKSIYON SİMÜLATÖRÜ**Malzemenin özellikleri :**

- Model sınıf içinde grup uygulamaları için geliştirilmiş bir yapıdadır.
- Hem görsel hem de pratik beceri eğitimi verilebilmektedir.
- Maket üzerinde kemik yapılar da simülle edilmiş olup, sayede femur üst ucu yada büyük trochanter, posterior superior ve anterior superior iliac sinirler ve sacrum seçilebilmektedir.
- Üst bacak ve kalça kısmı, iğne uygulamaları için gerçege yakın doku niteliğindedir.
- Kas, sinir ve damar yapılarının görülebilmesi için kaba et bölümünde (sol gluteal bölge üst dış kadranında) açılabilir bir kısım vardır. Bu bölümde gluteus medius ve gluteus maximus kasları, siyatik sinir, vasküler yapılar açıkça görülebilmektedir.
- Dorsogluteal, ventrogluteal ve vastus lateralis enjeksiyonlarına olanak sağlamaktadır.

7.5) Intramuskuler enjeksiyon yapma becerisi

1. Elleri yıkama
2. Hastaya işlem hakkında bilgi verme
3. Hastaya uygun pozisyon verme*
4. Eldiven giyme
5. Enjektöre ilaç çektmeden önce ilaçın uygunluğunu kontrol etme**
6. Bir parça pamuğu alkollé ıslatma
7. Enjektörü steril ambalajından çıkarıp ignesini takma
8. İlaç flakonunun kapağını steril olarak açma
9. Enjektörün kapağını açma
10. Enjektör ignesini flakonun lastik tipasından içeri sokma
11. İlacı enjektöre çekme
12. Enjektör ignesini flakondan çıkarma
13. Enjektörü dik tutup hafifçe vurarak hava kabarcıklarının üst bölgede toplanmasını sağlama
14. Enjektörün pistonunu hafifçe iterek havayı çıkarma
15. Enjeksiyon bölgesini belirleme***
16. Enjeksiyon bölgesini alkollü pamukla 5 cm çapında içten dışa doğru dairesel hareketle bir defada silme
17. Enjeksiyon bölgesini pasif elin 1 ve 2. parmaklarıyla germe
18. Enjektörü ignenin açık ucunu üstten görecek şekilde aktif el ile kalem tutar gibi tutarak dik açıyla ve hızla dokuya girme
19. Igne doku içinde iken enjektörü kipirdatmadan sabit tutma
20. Enjektör pistonunu pasif elle geri çekerek kas içine girildigini kontrol etme
21. İlacı yavaşça, dokuda basıncı oluşturmamak için hızda enjekte etme
22. Kuru pamukla bastırırken enjektörü aynı açı ve hızla geri çekme
23. Kanama durumuna kadar enjeksiyon alanına kuru pamukla hafifçe bastırma
24. Ignenin koruyucu kapağını kapatmadan enjektörü delici kesici atık kutusuna atma
25. Kullanılan malzemeleri kırmızı çöp torbasına atma
26. Eldivenleri çıkarma
27. Elleri yıkama

* Dorsogluteal bölge için hasta yüzüstü yatırılarak kalça eklemi içe rotasyon yapacak ve başparmaklar birbirine bakacak şekilde ayakları içe çevirme.

Deltoid bölge için hastayı sırtüstü ya da oturur pozisyonuna getirerek deltoid bölgesini açma.

** Son kullanma tarihi, uygun ısı, renk, doğru ilaç.

***+ Dorsogluteal bölge için gluteal bölgeyi krista iliaka, gluteal kıvrım ve koksaların arasındaki bölümle sınırlandırıp enine ve boyuna çizgilerle dört parçaya bölgerek üst dış bölgeye enjeksiyon uygulanır.Deltoid bölge için omuz tepesindeki akromion eksikliği ile kolun aksiller hattının belirlenmesi ve bu alanda oluşturulan üçgenin orta noktasına enjeksiyon uygulanır.